

核准日期: 2009年04月02日 修改日期: 2021年06月11日
修改日期: 2009年07月03日 修改日期: 2025年10月01日
修改日期: 2021年09月10日

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语: 本品为人血液制品, 尽管经过筛选及病毒灭活处理, 仍不能完全排除含有病毒等未知病原体而引起的血源性疾病传播的可能, 使用本品时, 应查验和记录所用产品的生产企业和批号。

【药品名称】通用名称: 人血白蛋白 英文名称: Human Albumin 汉语拼音: Renxue Baidanbai

【成份】

1. 人血白蛋白, 来源于健康人血浆。
2. 主要辅料: 辛酸钠
3. 分子量: 66300
4. 钠不超过160mmol/L, 钾不超过5.2mmol/L, 半渗透压140-160mmol/L(25℃)

【适应症】

1. 失血、创伤及烧伤等引起的低血容量休克。
2. 由于肾病综合征因蛋白丢失引起的水肿病人和肝硬化引起的水肿, 输注人血白蛋白可能有助于治疗。

3. 低蛋白血症的患者, 在治疗原发性疾病的同时, 输注白蛋白是一种有益的辅助治疗。

4. 用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。

【规格】5% (5g/瓶), 每瓶含人血白蛋白5g, 装量100ml。

【用法用量】

本品为处方药, 应在医师指导下使用。

核准日期：2009年04月02日 修改日期：2021年11月22日
修改日期：2016年01月26日 修改日期：2025年03月31日
修改日期：2020年12月30日 修改日期：2025年03月31日

TONROL 同路®



核准日期：2006年09月29日 修改日期：2021年08月19日 修改日期：2022年10月01日

本品为处方药，应在医生指导下使用。

用法：口服，每日3次，每次1片，用温开水送服。

用法：口服，每日3次，每次1片。

全身性疾病及给药部位各种反应：发热、寒战、胸部不适、畏寒、虚弱、水肿、疼痛、胸痛、注射部位皮疹、注射部位肿胀、注射部位痛；

皮肤及皮下组织：皮疹、荨麻疹、斑丘疹、丘疹、红斑、水疱、瘙痒、多汗、皮肤肿胀、**血管性水肿**；

呼吸系统：**窒息感**、**呼吸困难**、**呼吸急促**、**血氧饱和度降低**、**咳嗽**、**喉水肿**、**哮喘**、**肺水肿**；

消化系统：恶心、呕吐、腹胀、**便秘**、**腹痛**、**胸部不适**、**口腔感觉异常**、**消化道出血**；

免疫系统：**过敏反应**、**过敏性反应**、**过敏性休克**、**过敏性皮炎**、**过敏性哮喘**；

泌尿系统：心悸、心动过速、心律不齐、**胸闷**、**心动过缓**、**心力衰竭**、**心肌梗死**；

神经系统：头晕、头痛、震颤、感觉减退、味觉障碍、嗜睡、昏迷、**意识丧失**；

其他：低血压、潮热、寒战、面色苍白、**低氧血症**。

【老年用药】：尚无专门研究，慎用。

【药物相互作用】：本品与下列药物合用时，可增加不良反应发生率，应谨慎使用。

【药物过量】：本品过量使用可引起严重不良反应，应立即停药并就医。

【药理作用】：本品为一种水溶性高分子化合物，能吸收组织间隙水分，使组织膨胀，从而减轻组织水肿。本品在体内可被酶解，其代谢产物可经肾脏排出。

本品在体内可被酶解，其代谢产物可经肾脏排出。

本品在体内可被酶解，其代谢产物可经肾脏排出。

2. 运输及解毒：白蛋白能结合阴离子也能结合阳离子，可以输送不同的物质，也可以将有毒物质输送到解毒器官，具有运输和解毒作用。

3. 营养供给：由于组织蛋白和血浆蛋白可互相转化，在氮代谢障碍时，白蛋白可作为氮源为组织提供营养。

【药代动力学】

人血白蛋白半衰期为19天，在肝脏内合成、代谢。白蛋白在全身组织中并遵循以下规律：在全身组织中，白蛋白的分布容积为0.7L/kg，其清除率为0.1L/kg/h，其排泄率为0.1L/kg/h。

人血白蛋白在体内可被酶解，其代谢产物可经肾脏排出。

核准日期：2006年09月28日 修改日期：2021年04月01日 修改日期：2025年10月01日
修改日期：2014年09月26日 修改日期：2021年09月10日
修改日期：2020年08月11日 修改日期：2021年11月22日

TONROL 同路®

用法

用量

规格

【用法用量】

【规格】

【执行标准】《中国药典》2020年版三部附录B 通则 YBS10382020

【批准文号】国药准字S10960084

【药品上市许可持有人】

名称：同路生物制药有限公司 地址：合肥

同路生物

同路生物

核准日期：2006年09月29日 修改日期：2021年09月10日 修改日期：2025年10月01日

修改日期：2014年09月26日

修改日期：2021年09月10日

修改日期：2020年08月11日

修改日期：2021年11月22日

修改日期：2020年12月30日

修改日期：2025年03月31日

TONROL 同路®

人血白蛋白说明书

20% (50ml:10g)



请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：本品为人血制品，尽管经过筛检及病毒灭活处理，仍不能完全排除含有病毒等未知病原体而引起的血源性疾病传播的可能。使用时，应查验和记录所用产品的生产企业和批号。

【药品名称】通用名称：人血白蛋白 英文名称：Human Albumin 汉语拼音：Renxue Baidanbai

【成份】

1.人血白蛋白，来源于健康人血浆。

2.主要辅料：辛酸钠

3.分子量：66300

4.钠不超过160mmol/L，钾不超过5mmol/L，氯不超过100mmol/L。

核准日期：2009年04月02日 修改日期：2021年11月22日

核准日期：2016年02月03日
2020年12月30日 修改日期：2025年10月01日
21年09月10日

核准日期：2016年
修改日期：20
修改日期：20

人血白蛋白说明书

25% (12.5g / 瓶)

人血白蛋白

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

本品为人血制品，虽经特殊处理及病毒灭活处理，仍不能完全排除含有病毒等未知病原体而引起血源性疾病传播的可能，使用本品前应进行病毒筛查，并记录所用产品的生产企业和批号。

【名称】通用名称：人血白蛋白，英文名称：Human Albumin，汉语拼音：Renxue Baiqibai。

人血白蛋白，来源于健康人血浆。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。

本品为处方药，应在医生指导下使用。本品为处方药，应在医生指导下使用。