

核准日期：2008年07月18日 修改日期：2014年11月18日 修改日期：2019年03月12日		核准日期：2020年12月30日 修改日期：2021年09月10日 修改日期：2025年10月01日		【注意事项】 1.本品专供静脉输注。 2.特发性血小板减少性紫癜	
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					
用量					
用法用量					
用法					

核准日期：2006年12月20日 修改日期：2020年10月09日
修改日期：2014年11月18日 修改日期：2021年09月10日
修改日期：2019年03月12日 修改日期：2022年02月27日

“YONEX 百裕”

【注意事项】

【规格】

本品为白色或淡黄色澄清液体，可带轻微乳光。

【性状】 本品为白色或淡黄色澄清液体，可带轻微乳光。

【适应症】

本品为白色或淡黄色澄清液体，可带轻微乳光。

1. 原发性免疫球蛋白缺乏症，如X连锁低免疫球蛋白血症，常染色体显性遗传性免疫球蛋白A缺陷症等。

2. 继发性免疫球蛋白缺陷病，如重症感染、新生儿败血症等。

3. 自身免疫功能紊乱，如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。

本品为白色或淡黄色澄清液体，可带轻微乳光。

【用法用量】 本品应单独输注，禁止与其他药物混合输注。

【老年用药】 本品应单独输注，禁止与其他药物混合输注。

【药物相互作用】 本品应单独输注，禁止与其他药物混合输注。

【药物过量】 尚无研究资料。

【药理毒理】

本品为免疫球蛋白，含有多种免疫球蛋白，能增强机体免疫功能，提高机体抗病能力。本品不含任何防腐剂，不含任何有害物质，不含任何致敏物质。

